

CALENDÁRIO VACINAL SBIIm 2019/2020

Do nascimento à terceira idade.



VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																				ADOLESCENTE	ADULTO	IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS			
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 anos	11 a 19 anos	20 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS	NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIES*	
BCG ID	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente													Vacinar pessoas contactantes de hanseníase						SIM	SIM	NÃO				
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento							Vacinar os não vacinados anteriormente													SIM	SIM	SIM				
Rotavírus	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.							CONTRAINDICADA													SIM	SIM	NÃO				
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)	Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa	Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, fazer dT)						SIM, DTPw e dT dTpa para gestantes	SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa					
Haemophilus influenzae tipo b	Três doses iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente	Vacinar pessoas em situações especiais de risco						SIM, três primeiras doses	SIM	SIM, até 19 anos					
Poliomielite (vírus inativados)	Três doses iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	REFORÇO	Vacinar pessoas em situações especiais de risco						SIM, três primeiras doses	SIM	SIM					
Pneumocócicas conjugadas	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VPC10 ou VPC13), iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	VPC10 ou VPC13 - Vacinar os não vacinados anteriormente	VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco				VPC13: uma dose	SIM, VPC10, menores de 5 anos	SIM	SIM, VPC10						
Meningocócicas conjugadas	Men ACWY – duas ou três doses a depender do fabricante, iniciando aos 3 meses de idade. Men C – duas doses iniciando aos 3 meses de idade.											REFORÇO	REFORÇO	REFORÇO	REFORÇO aos 11 anos. Para os não vacinados anteriormente: duas doses, com intervalo de 5 anos				Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, menC para menores de 5 anos e adolescentes de 11 a 14 anos	SIM	SIM, menC				
Meningocócica B	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade											REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente – De 12 a 23 meses e 29 dias: três doses De 24 meses a 19 anos: duas doses				Vacinar pessoas em situações especiais de risco		NÃO	SIM	NÃO						
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)	CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO																				SIM	NÃO	NÃO				
Influenza (gripe)	VACINAÇÃO ANUAL																				SIM, menores de 6 anos e maiores de 60 anos		SIM	SIM			
Febre amarela	EM REGIÕES COM RECOMENDAÇÃO DE VACINAÇÃO – Dose única a partir dos 9 meses de idade. A recomendação de uma segunda dose, especialmente para os vacinados antes de 2 anos de idade, não é consensual, mas deve ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.																				SIM	SIM	NÃO				
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, até 49 anos	SIM	NÃO					
Varicela (catapora)	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente								SIM	SIM	SIM					
Hepatite A	Duas doses a partir dos 12 meses											Vacinar os não vacinados anteriormente						Vacinar pessoas em situações especiais de risco		SIM, uma dose para menores de 5 anos		SIM	SIM				
HPV												Duas doses para meninas e meninos		Vacinar os não vacinados anteriormente. Para menores de 15 anos: duas doses. De 15 anos em diante: três doses.		Vacinar os não vacinados anteriormente, a critério médico (três doses)		SIM, duas doses. Meninas (9 a 14 anos) e meninos (11 a 14 anos)		SIM	SIM						
Pneumocócica 23 valente												Vacinar pessoas em situações especiais de risco						Duas doses com intervalo de cinco anos		NÃO	SIM	SIM					
Herpes zóster																		De 50 a 59 anos: a critério médico		Uma dose		NÃO	SIM	NÃO			
Dengue	CONTRAINDICADA													Recomendada para pessoas soropositivas para dengue, de 9 a 45 anos: três doses: 0 – 6 – 12 meses						CONTRAINDICADA		NÃO	SIM	NÃO			

19/06/2019 • Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos *Calendários de vacinação SBIIm 2019/2020* e nos *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.

* Consultar manual do CRIE em www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/-01VACINA/manual_procedimentos_2014.pdf
Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.

